

(参考)

水 稲 用 農 薬 一 覧

令和8年6月1日現在

	品 名	使用時期	規定 使用 量	使用回数	主 な 対 象 病 害 虫 等
殺虫殺菌剤	タチガレエースM液剤	播種時又は 発芽後	希釈倍数 500～1000倍 希釈液 500ml/箱	1回	苗立枯病
	ガゼット粒剤	移植前3日～ 移植当日	50～70g/ 箱	1回	イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、イネゾウムシ、ツマグロヨコバイ、ヒメトビウンカ、イネヒメハモグリバエ
	ブーンアレス箱粒剤	播種時(覆土前)～ 移植当日	50g/箱	1回	いもち病、もみ枯細菌病、イナゴ類、ウンカ類、イネミズゾウムシ、ニカメイチュウ、コブノメイガ
	フルスロツトル箱粒剤	播種時(覆土前)～ 移植当日	50g/箱	1回	いもち病、紋枯病、ウンカ類、イネミズゾウムシ、ニカメイチュウ、コブノメイガ、ツマグロヨコバイ
	防人(さきもり)箱粒剤	播種時(覆土前)～ 移植当日	50g/箱	1回	いもち病、もみ枯細菌病、内えい褐変病、ウンカ類、イネミズゾウムシ、ニカメイチュウ、コブノメイガ
	アプロードパダン粒剤	収穫30日前迄	3～ 4kg/10a	4回	ニカメイチュウ、コブノメイガ イネツトムシ、ウンカ類幼虫
	パダン粒剤4	収穫30日前迄	3～ 4kg/10a	6回	コブノメイガ、フタオビコヤガ、 ニカメイチュウ、イネツトムシ、アザミウマ
	スタークル粒剤	収穫7日前迄	3kg/10a	3回	ウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類
	スタークル豆つぶ	収穫7日前迄	250g/10a	3回	ウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類
	スクミノン	収穫60日前迄	1～4kg /10a	2回	スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)
	スクミンベイト3	発生時	2～8kg /10a	—	スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)
除 草 剤	コラトップ粒剤5	葉いもち:初発10日前～初発時 穂いもち:出穂30～5日前迄	3～ 4kg/10a	2回	いもち病、もみ枯れ細菌病
	モンカット粒剤	出穂30～10日前但し 収穫14日前迄	3～ 4kg/10a	4回	紋枯病
	サキドリEW (水稲初期剤)	植代時～ 移植7日前迄	500ml/10a	1回	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ
	バッチリLXフロアブル	移植直後～30日 (ノビE2.5葉期迄)	500ml/10a	1回	水田一年生雑草、オモダカ、クロクワイ
	コメット1キロ粒剤	田植時・移植直後～30日 (ノビE2.5葉期迄)	1kg/10a	1回	水田一年生雑草、多年生広葉雑草
	クサトリ-DXジャンボL	移植後3～30日 (ノビE2.5葉期迄)	小包装(パック) 10個/10a	1回	水田一年生雑草、ホタルイ
	ワザアリジャンボ	移植直後～30日 (ノビE3葉期迄)	小包装(パック) 10個/10a	1回	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ
	セカンドショットSジャンボMX	移植後14日～ノビE3.5 葉期(収穫45日前迄)	小包装(パック) 20個/10a	1回	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ
	ウィードコア1キロ粒剤	移植後7日～収穫60日 前(ノビE4葉期迄)	1kg/10a	2回	水田一年生雑草、キシウスズメノヒエ、水田多年生広葉雑草
	モゲトン粒剤	収穫45日前迄	2～ 3kg/10a	3回	ウキクサ類、藻類
	クリンチャーEW	移植後20日～収穫30日 前迄 ノビE6葉期	100ml/10a	2回	ノヒエ、キシウスズメノヒエ、アゼガヤ

※農薬を使用する際には、ラベルをよくお読みになり適正使用をお願いいたします。